

新型コロナウイルス感染症予防接種を受けるに当たっての説明書

1) 接種前に必ずお読みください

・本説明書

・予防接種予診票 2枚目の裏面「新型コロナワクチンの接種について」

なお、ワクチンの詳しい説明については、町ホームページに掲載していますので、ご参照ください。

町ホームページの QR コード→



2) 接種後の注意事項

ワクチンの接種を受けた後は、15分以上(過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上)、接種を受けた医療機関でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ相談してください。

3) 予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものかの因果関係を専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

※給付申請の必要が生じた場合は、診察した医師、菊陽町役場 健康・保険課へご相談ください。

厚生労働省のホームページもご参照ください→

裏面もご覧ください。

新型コロナワクチン一覧表

※使用するワクチンについては医療機関にご確認ください。

種類	コミナティ筋注 シリンジ 12歳以上用	スパイボックス筋注	ダイチロナ筋注	コスタイベ筋注用	ヌバキソビッド筋注
販売会社	ファイザー	モデルナ	第一三共	MeijiSeika	武田
効能・効果	SARS—CoV—2による感染症の予防				
同時接種の可否	医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することが可能				
重大な副反応	ショック、アナフィラキシー、心筋炎・心膜炎(※)				
その他の副反応	【5%以上】 <注射部位> 疼痛、腫脹、発赤、紅斑 <注射部位以外> 頭痛、下痢、筋肉痛、関節痛、リンパ節症、疲労、悪寒、発熱	【1%以上】 <注射部位> 疼痛、腫脹、硬結、発赤、紅斑、遅発性反応(疼痛、腫脹、紅斑) <注射部位以外> 易刺激性、泣き、頭痛、傾眠、悪心・嘔吐、食欲減退、筋肉痛、関節痛、リンパ節症、疲労、悪寒、発熱	【10%以上】 <注射部位> 疼痛、熱感、腫脹、紅斑、そう痒感、硬結 <注射部位以外> 頭痛、筋肉痛、倦怠感、発熱	【10%以上】 <注射部位> 圧痛、疼痛、腫脹、硬結、紅斑 <注射部位以外> 頭痛、めまい、筋肉痛、関節痛、倦怠感、悪寒、発熱	【10%以上】 <注射部位> 圧痛、疼痛 <注射部位以外> 頭痛、悪心・嘔吐、筋肉痛、関節痛、疲労、倦怠感

(※)心筋炎・心膜炎が疑われる症状(胸痛・動悸・むくみ・呼吸困難・頻呼吸等)が認められた場合には、速やかに医師の診察を受けるようにしてください。

<問合せ先>

菊陽町役場 健康・保険課 健康増進係

TEL:096-232-4912